

Vacunación de Adolescentes de 11-18 de edad



Vacuna	Dosis	Tiempo de Inmunización
Hepatitis B (Hep B) ¹	3 dosis	1ra dosis 2da dosis 1 mes después de la 1ra dosis 3ra dosis 4-6 meses después de la 2da dosis
Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR) ²	2 dosis	1ra dosis 2da dosis 1 mes después de la 1ra dosis
Varicela (Chickenpox) ³	2 dosis	1ra dosis 2da dosis 1-3 meses después de la 1ra dosis según edad
Hepatitis A (Hep A) ⁴	2 dosis	1ra dosis 2da dosis 6-12 meses después de la 1ra dosis
Influenza (Gripe) ⁵	1 dosis	1 dosis anual
Antineumocócica ⁶	1 dosis	1 dosis para adolescentes con enfermedades serias
Meningocócica ⁷	2 dosis	1 dosis es recomendada a los 11-12 años de edad con dosis de refuerzo a los 16 años
Tdap (Tétano, Difteria, Pertussis) ⁸	1 dosis	1 dosis de Tdap es recomendada a los 11-12 años de edad
Papiloma Humano (HPV) ⁹	3 dosis	1 dosis 2da dosis 1-2 meses después de la 1ra dosis 3ra dosis 6 meses después de la 1ra dosis

Vea el lado reverso para recomendaciones detalladas.

Llamada gratis: 1-800-275-0659 | www.immunize-utah.org

- 1 Hepatitis B:** Para una protección completa contra la hepatitis B se necesitan tres dosis de esta vacuna. Existe una vacuna para la hepatitis B de dos dosis disponible para los adolescentes de 11-15 años de edad.
- 2 Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR):** Two doses of the MMR vaccine are recommended to provide full protection for adolescents who have not previously been vaccinated. The MMR vaccine should not be given to adolescents who are known to be pregnant or who are considering becoming pregnant within one month of vaccination.
- 3 Varicela (Chickenpox):** La vacuna contra la varicela se recomienda para cualquier persona que no ha tenido varicela o no ha recibido la vacuna contra la varicela. La vacuna contra la varicela no debe administrarse a las adolescentes embarazadas o las que están pensando en quedar embarazadas dentro de un mes de la vacunación.
- 4 Hepatitis A:** Se recomiendan dos dosis de la vacuna contra la hepatitis A para quienes hayan sido vacunados previamente.
- 5 Influenza (Gripe):** Se recomienda una vacuna anual contra la gripe para todos los adolescentes.
- 6 Vacuna Antineumocócica:** Se recomienda una única dosis de la vacuna antineumocócica conjugada para todos los adolescentes con enfermedades graves como la diabetes, leucemia, enfermedad del corazón, enfermedad pulmonar, infección por VIH (HIV) o el SIDA.
- 7 Meningocócica (Meningitis):** Se recomiendan dos dosis de vacuna conjugada meningocócica (MCV) para los adolescentes. La primera dosis se recomienda a los 11-12 años de edad, con un refuerzo a los 16 años de edad. Los adolescentes que recibieron MCV por primera vez a los 13 años hasta los 15 años de edad, necesitarán una única dosis de refuerzo entre los 16 y 18 años de edad.
- 8 Tdap (Tétano, Difteria, Pertussis):** Se recomienda una dosis de la vacuna Tdap para los adolescentes. Los adolescentes de 11-18 años de edad que nunca recibieron la vacuna Tdap deben recibir una sola dosis de Tdap. Una dosis de la vacuna Tdap se recomienda durante cada embarazo (preferiblemente durante las 27 a 36 semanas de gestación), esto independientemente del tiempo transcurrido desde la anterior Td o vacuna Tdap.
- 9 Pápiloma Humano (HPV):** Se recomiendan tres dosis de la vacuna contra el HPV para todos los adolescentes de 11-12 años de edad. Si se vacuna para compensar un atraso, se recomienda a los 13 a 18 años de edad, si no fueron previamente vacunados o si no han terminado la serie de vacunas completamente.